

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	336	217	137	134
ロイシン	1.6%	567	397	246	213
リジン	1.6%	588	199	127	228
メチオニン	0.6%	204	199	119	
シスチン	0.3%	108			
メチオニン・シスチン計	0.9%	315	379	235	155
フェニルアラニン	0.9%	337	271	163	
チロシン	0.7%	263			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	600	434	267	264
スレオニン	1.0%	344	253	155	174
トリプトファン	0.3%	99	83	51	58
バリン	1.1%	410	289	177	141
ヒスチジン	0.9%	325	112	69	65
アルギニン	1.3%	481	199	127	184

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	336	262	250	180
ロイシン	567	443	440	410	101	108
リジン	588	459	340	360	135	127
メチオニン・シスチン計	315	246	220	160	112	154
フェニルアラニン・チロシン計	600	468	380	390	123	120
スレオニン	344	268	250	210	107	128
トリプトファン	99	77	60	70	129	111
バリン	410	320	310	220	103	145
ヒスチジン	325	253	-	120	-	211
全窒素量(g)	1.3					

