

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	313	217	132	128
ロイシン	1.5%	524	397	235	204
リジン	1.6%	550	199	121	218
メチオニン	0.5%	183	199	114	
シスチン	0.3%	98			
メチオニン・シスチン計	0.8%	282	379	225	149
フェニルアラニン	0.9%	306	271	156	
チロシン	0.7%	240			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	545	434	256	253
スレオニン	0.9%	306	253	149	166
トリプトファン	0.3%	89	83	48	55
バリン	1.1%	368	289	170	135
ヒスチジン	0.6%	217	112	66	62
アルギニン	1.3%	453	199	121	177

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（％）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	313	280	250	180	112	156
ロイシン	524	469	440	410	107	114
リジン	550	492	340	360	145	137
メチオニン・シスチン計	282	252	220	160	115	158
フェニルアラニン・チロシン計	545	488	380	390	128	125
スレオニン	306	274	250	210	110	130
トリプトファン	89	80	60	70	133	114
バリン	368	330	310	220	106	150
ヒスチジン	217	194	-	120	-	162
全窒素量(g)	1.1					

