

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	312	217	138	135
ロイシン	1.4%	521	397	247	215
リジン	1.5%	547	199	127	229
メチオニン	0.5%	183	199	120	
シスチン	0.3%	100			
メチオニン・シスチン計	0.8%	284	379	236	156
フェニルアラニン	0.8%	305	271	164	
チロシン	0.6%	236			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	541	434	269	265
スレオニン	0.8%	308	253	156	175
トリプトファン	0.2%	88	83	51	58
バリン	1.0%	367	289	178	142
ヒスチジン	0.6%	218	112	69	65
アルギニン	1.2%	451	199	127	185

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	312	274	250	180	110	152
ロイシン	521	457	440	410	104	112
リジン	547	481	340	360	141	134
メチオニン・シスチン計	284	249	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	541	476	380	390	125	122
スレオニン	308	271	250	210	108	129
トリプトファン	88	78	60	70	130	111
バリン	367	322	310	220	104	146
ヒスチジン	218	191	-	120	-	159
全窒素量(g)	1.1					

