

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	364	217	149	145
ロイシン	1.6%	614	397	267	232
リジン	1.6%	620	199	137	247
メチオニン	0.6%	217	199	130	
シスチン	0.3%	123			
メチオニン・シスチン計	0.9%	343	379	255	169
フェニルアラニン	0.9%	369	271	177	
チロシン	0.7%	285			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	654	434	290	287
スレオニン	0.9%	368	253	169	188
トリプトファン	0.3%	107	83	55	63
バリン	1.1%	440	289	192	153
ヒスチジン	0.9%	346	112	75	71
アルギニン	1.3%	510	199	137	200

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	364	267	250	180	107	148
ロイシン	614	451	440	410	102	110
リジン	620	455	340	360	134	126
メチオニン・シスチン計	343	252	220	160	114	157
フェニルアラニン・チロシン計	654	480	380	390	126	123
スレオニン	368	270	250	210	108	129
トリプトファン	107	79	60	70	132	113
バリン	440	323	310	220	104	147
ヒスチジン	346	254	-	120	-	211
全窒素量(g)	1.4					

