

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	392	217	163	159
ロイシン	1.6%	666	397	292	253
リジン	1.6%	680	199	150	270
メチオニン	0.5%	222	199	142	
シスチン	0.3%	131			
メチオニン・シスチン計	0.8%	354	379	279	184
フェニルアラニン	0.9%	383	271	193	
チロシン	0.7%	295			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	678	434	317	313
スレオニン	0.9%	380	253	184	206
トリプトファン	0.3%	110	83	60	69
バリン	1.1%	463	289	210	167
ヒスチジン	0.6%	240	112	81	77
アルギニン	1.3%	542	199	150	219

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	392	277	250	180
ロイシン	666	470	440	410	107	115
リジン	680	480	340	360	141	133
メチオニン・シスチン計	354	250	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	678	478	380	390	126	123
スレオニン	380	268	250	210	107	128
トリプトファン	110	77	60	70	129	111
バリン	463	327	310	220	105	149
ヒスチジン	240	169	-	120	-	141
全窒素量(g)	1.4					

