

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.7%	354	217	186	181
ロイシン	1.2%	581	397	332	288
リジン	1.2%	595	199	171	308
メチオニン	0.4%	211	199	161	
シスチン	0.2%	113			
メチオニン・シスチン計	0.7%	327	379	318	210
フェニルアラニン	0.7%	344	271	220	
チロシン	0.5%	265			
フェニルアラニン・チロシン計	1.2%	608	434	362	357
スレオニン	0.7%	339	253	210	235
トリプトファン	0.2%	103	83	68	78
バリン	0.9%	416	289	239	191
ヒスチジン	0.9%	442	112	93	88
アルギニン	1.0%	472	199	171	249

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	354	280	250	180	112	155
ロイシン	581	459	440	410	104	112
リジン	595	469	340	360	138	130
メチオニン・シスチン計	327	258	220	160	117	161
フェニルアラニン・チロシン計	608	480	380	390	126	123
スレオニン	339	267	250	210	107	127
トリプトファン	103	81	60	70	135	116
バリン	416	328	310	220	106	149
ヒスチジン	442	349	-	120	-	291
全窒素量(g)	1.3					

