

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.7%	313	217	161
ロイシン	1.2%	509	397	289
リジン	1.3%	544	199	149
メチオニン	0.4%	187	199	140
シスチン	0.2%	98		
メチオニン・シスチン計	0.7%	287	379	276
フェニルアラニン	0.7%	298	271	191
チロシン	0.5%	230		
フェニルアラニン・チロシン計	1.2%	528	434	314
スレオニン	0.7%	305	253	183
トリプトファン	0.2%	90	83	59
バリン	0.9%	368	289	208
ヒスチジン	1.0%	405	112	81
アルギニン	1.0%	409	199	149

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	313	267	250	180
ロイシン	509	434	440	410	99	106
リジン	544	464	340	360	137	129
メチオニン・シスチン計	287	245	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	528	450	380	390	118	115
スレオニン	305	260	250	210	104	124
トリプトファン	90	77	60	70	129	110
バリン	368	314	310	220	101	143
ヒスチジン	405	346	-	120	-	288
全窒素量(g)	1.2					

