



アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	341	217	146
ロイシン	1.5%	578	397	261
リジン	1.5%	583	199	134
メチオニン	0.5%	208	199	127
シスチン	0.3%	115		
メチオニン・シスチン計	0.8%	326	379	249
フェニルアラニン	0.9%	345	271	173
チロシン	0.7%	263		
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	608	434	284
スレオニン	0.9%	349	253	165
トリプトファン	0.3%	100	83	54
バリン	1.1%	417	289	188
ヒスチジン	0.9%	328	112	73
アルギニン	1.3%	483	199	134

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	341	257	250	180
ロイシン	578	435	440	410	99	106
リジン	583	439	340	360	129	122
メチオニン・シスチン計	326	245	220	160	112	153
フェニルアラニン・チロシン計	608	458	380	390	121	117
スレオニン	349	263	250	210	105	125
トリプトファン	100	76	60	70	126	108
バリン	417	314	310	220	101	143
ヒスチジン	328	247	-	120	-	206
全窒素量(g)	1.3					

