

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	353	217	152	148
ロイシン	1.5%	594	397	272	236
リジン	1.5%	616	199	140	252
メチオニン	0.5%	212	199	132	
シスチン	0.3%	115			
メチオニン・シスチン計	0.8%	330	379	260	172
フェニルアラニン	0.9%	354	271	180	
チロシン	0.7%	275			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	629	434	296	292
スレオニン	0.9%	362	253	172	192
トリプトファン	0.3%	104	83	56	64
バリン	1.1%	430	289	196	156
ヒスチジン	0.8%	339	112	76	72
アルギニン	1.3%	501	199	140	204

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	353	258	250	180
ロイシン	594	434	440	410	99	106
リジン	616	451	340	360	133	125
メチオニン・シスチン計	330	241	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	629	460	380	390	121	118
スレオニン	362	265	250	210	106	126
トリプトファン	104	76	60	70	127	109
バリン	430	315	310	220	102	143
ヒスチジン	339	248	-	120	-	207
全窒素量(g)	1.4					

