

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	361	217	146	142
ロイシン	1.6%	609	397	261	227
リジン	1.6%	632	199	135	242
メチオニン	0.6%	217	199	127	
シスチン	0.3%	116			
メチオニン・シスチン計	0.9%	336	379	250	165
フェニルアラニン	0.9%	362	271	173	
チロシン	0.7%	283			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	645	434	285	281
スレオニン	1.0%	368	253	165	185
トリプトファン	0.3%	107	83	54	62
バリン	1.1%	439	289	188	150
ヒスチジン	0.9%	348	112	73	69
アルギニン	1.3%	512	199	135	196

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	361	261	250	180	104	145
ロイシン	609	440	440	410	100	107
リジン	632	456	340	360	134	127
メチオニン・シスチン計	336	243	220	160	110	152
フェニルアラニン・チロシン計	645	466	380	390	123	119
スレオニン	368	266	250	210	106	127
トリプトファン	107	77	60	70	128	110
バリン	439	317	310	220	102	144
ヒスチジン	348	251	-	120	-	209
全窒素量(g)	1.4					

