

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	327	217	148	144
ロイシン	1.4%	560	397	264	229
リジン	1.5%	585	199	136	245
メチオニン	0.5%	190	199	128	
シスチン	0.3%	108			
メチオニン・シスチン計	0.8%	299	379	253	167
フェニルアラニン	0.8%	319	271	175	
チロシン	0.7%	259			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	578	434	288	284
スレオニン	0.8%	314	253	167	187
トリプトファン	0.2%	93	83	54	62
バリン	1.0%	379	289	190	152
ヒスチジン	0.5%	211	112	74	70
アルギニン	1.2%	479	199	136	198

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	327	262	250	180
ロイシン	560	449	440	410	102	109
リジン	585	469	340	360	138	130
メチオニン・シスチン計	299	240	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	578	464	380	390	122	119
スレオニン	314	252	250	210	101	120
トリプトファン	93	75	60	70	125	107
バリン	379	304	310	220	98	138
ヒスチジン	211	169	-	120	-	141
全窒素量(g)	1.2					

