

| アミノ酸(参考) | | | | | |
|----------------|--------------|-----|------------|---------|---------|
| | このレシビで摂取できる量 | | このレシビでの推奨量 | | |
| | /DM | mg | NRC | | AAFCO |
| | | | 体重0.75乗ベース | 乾燥重量ベース | 乾燥重量ベース |
| イソロイシン | 0.9% | 410 | 217 | 165 | 160 |
| ロイシン | 1.5% | 670 | 397 | 295 | 256 |
| リジン | 1.6% | 714 | 199 | 152 | 273 |
| メチオニン | 0.6% | 249 | 199 | 143 | |
| シスチン | 0.3% | 124 | | | |
| メチオニン・シスチン計 | 0.9% | 376 | 379 | 282 | 186 |
| フェニルアラニン | 0.9% | 388 | 271 | 195 | |
| チロシン | 0.7% | 305 | | | |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 1.6% | 693 | 434 | 321 | 317 |
| スレオニン | 0.9% | 393 | 253 | 186 | 208 |
| トリプトファン | 0.3% | 117 | 83 | 61 | 69 |
| バリン | 1.1% | 476 | 289 | 212 | 169 |
| ヒスチジン | 1.3% | 543 | 112 | 82 | 78 |
| アルギニン | 1.3% | 543 | 199 | 152 | 221 |

| アミノ酸スコア(参考) | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| このレシビで摂取できる量 (mg) | 窒素1gあたりの アミノ酸量 | 算定用評点パターン | | アミノ酸スコアを計算する(%) | | |
| | | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | |
| | | イソロイシン | 410 | 274 | 250 | 180 |
| ロイシン | 670 | 446 | 440 | 410 | 101 | 109 |
| リジン | 714 | 476 | 340 | 360 | 140 | 132 |
| メチオニン・シスチン計 | 376 | 251 | 220 | 160 | 114 | 157 |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 693 | 462 | 380 | 390 | 122 | 118 |
| スレオニン | 393 | 262 | 250 | 210 | 105 | 125 |
| トリプトファン | 117 | 78 | 60 | 70 | 130 | 111 |
| バリン | 476 | 317 | 310 | 220 | 102 | 144 |
| ヒスチジン | 543 | 362 | - | 120 | - | 302 |
| 全窒素量(g) | 1.5 | | | | | |

