

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	259	217	117	114
ロイシン	1.4%	429	397	210	182
リジン	1.5%	468	199	108	195
メチオニン	0.4%	137	199	102	
シスチン	0.2%	73			
メチオニン・シスチン計	0.7%	209	379	201	133
フェニルアラニン	0.8%	234	271	139	
チロシン	0.6%	180			
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	414	434	229	226
スレオニン	0.8%	258	253	133	148
トリプトファン	0.2%	70	83	43	49
バリン	0.9%	290	289	151	121
ヒスチジン	0.8%	251	112	59	56
アルギニン	1.1%	338	199	108	158

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
（mg）						
イソロイシン	259	287	250	180	115	160
ロイシン	429	475	440	410	108	116
リジン	468	519	340	360	153	144
メチオニン・シスチン計	209	232	220	160	105	145
フェニルアラニン・チロシン計	414	459	380	390	121	118
スレオニン	258	285	250	210	114	136
トリプトファン	70	78	60	70	129	111
バリン	290	321	310	220	104	146
ヒスチジン	251	278	-	120	-	232
全窒素量(g)	0.9					

