

アミノ酸(参考)				
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
				AAFCO 乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	318	217	142
ロイシン	1.5%	544	397	253
リジン	1.6%	578	199	130
メチオニン	0.5%	190	199	123
シスチン	0.3%	103		
メチオニン・シスチン計	0.8%	295	379	242
フェニルアラニン	0.8%	304	271	168
チロシン	0.7%	248		
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	552	434	276
スレオニン	0.8%	308	253	160
トリプトファン	0.2%	89	83	52
バリン	1.0%	368	289	182
ヒスチジン	0.6%	205	112	71
アルギニン	1.3%	470	199	130

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	318	262	250	180
ロイシン	544	450	440	410	102	110
リジン	578	478	340	360	140	133
メチオニン・シスチン計	295	244	220	160	111	152
フェニルアラニン・チロシン計	552	456	380	390	120	117
スレオニン	308	255	250	210	102	121
トリプトファン	89	74	60	70	123	105
バリン	368	304	310	220	98	138
ヒスチジン	205	169	-	120	-	141
全窒素量(g)	1.2					

