

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
	/DM	mg			
イソロイシン	0.7%	272	217	149	145
ロイシン	1.2%	474	397	267	231
リジン	1.2%	485	199	137	247
メチオニン	0.4%	161	199	129	
シスチン	0.3%	99			
メチオニン・シスチン計	0.4%	139	379	255	169
フェニルアラニン	0.8%	296	271	177	
チロシン	0.6%	222			
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	518	434	290	286
スレオニン	0.7%	276	253	169	188
トリプトファン	0.2%	85	83	55	63
バリン	0.8%	331	289	192	153
ヒスチジン	0.5%	192	112	75	71
アルギニン	1.0%	410	199	137	200

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	272	422	250	180	169	234
ロイシン	474	736	440	410	167	179
リジン	485	752	340	360	221	209
メチオニン・シスチン計	139	216	220	160	98	135
フェニルアラニン・チロシン計	518	804	380	390	212	206
スレオニン	276	428	250	210	171	204
トリプトファン	85	132	60	70	220	189
バリン	331	513	310	220	166	233
ヒスチジン	192	298	-	120	-	248
全窒素量(g)	0.6					

