



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	313	217	150	146
ロイシン	1.3%	511	397	268	233
リジン	1.1%	441	199	138	248
メチオニン	0.4%	163	199	130	
シスチン	0.4%	145			
メチオニン・シスチン計	0.8%	308	379	256	170
フェニルアラニン	0.8%	322	271	177	
チロシン	0.6%	242			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	564	434	292	288
スレオニン	0.7%	284	253	170	189
トリプトファン	0.2%	95	83	55	63
バリン	1.0%	390	289	193	154
ヒスチジン	0.4%	172	112	75	71
アルギニン	1.0%	379	199	138	201

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	313	288	250	180
ロイシン	511	472	440	410	107	115
リジン	441	407	340	360	120	113
メチオニン・シスチン計	308	285	220	160	129	178
フェニルアラニン・チロシン計	564	521	380	390	137	133
スレオニン	284	262	250	210	105	125
トリプトファン	95	88	60	70	147	126
バリン	390	360	310	220	116	164
ヒスチジン	172	158	-	120	-	132
全窒素量(g)	1.1					

