

[illegible]

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	338	217	155	151
ロイシン	1.4%	576	397	278	241
リジン	1.5%	622	199	143	257
メチオニン	0.5%	190	199	135	
シスチン	0.2%	102			
メチオニン・シスチン計	0.7%	294	379	265	175
フェニルアラニン	0.8%	335	271	184	
チロシン	0.6%	262			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	598	434	302	298
スレオニン	0.8%	339	253	175	196
トリプトファン	0.2%	95	83	57	65
バリン	1.0%	393	289	200	159
ヒスチジン	0.7%	276	112	78	73
アルギニン	1.1%	429	199	143	208

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	338	267	250	180	107	148
ロイシン	576	454	440	410	103	111
リジン	622	491	340	360	144	136
メチオニン・シスチン計	294	232	220	160	105	145
フェニルアラニン・チロシン計	598	472	380	390	124	121
スレオニン	339	268	250	210	107	127
トリプトファン	95	75	60	70	124	107
バリン	393	310	310	220	100	141
ヒスチジン	276	218	-	120	-	181
全窒素量(g)	1.3					

