

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	359	217	174	170
ロイシン	1.3%	585	397	312	271
リジン	1.3%	616	199	161	289
メチオニン	0.5%	208	199	151	
シスチン	0.2%	113			
メチオニン・シスチン計	0.7%	323	379	298	197
フェニルアラニン	0.8%	348	271	206	
チロシン	0.6%	267			
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	616	434	339	335
スレオニン	0.8%	346	253	197	220
トリプトファン	0.2%	104	83	64	73
バリン	0.9%	420	289	225	179
ヒスチジン	1.0%	447	112	87	83
アルギニン	1.0%	463	199	161	234

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	359	268	250	180	107	149
ロイシン	585	438	440	410	99	107
リジン	616	461	340	360	136	128
メチオニン・シスチン計	323	242	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	616	461	380	390	121	118
スレオニン	346	259	250	210	104	123
トリプトファン	104	78	60	70	130	111
バリン	420	315	310	220	101	143
ヒスチジン	447	334	-	120	-	278
全窒素量(g)	1.3					

