

[illegible]

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	340	217	163	159
ロイシン	1.3%	563	397	291	253
リジン	1.4%	605	199	150	270
メチオニン	0.4%	190	199	141	
シスチン	0.2%	107			
メチオニン・シスチン計	0.7%	298	379	279	184
フェニルアラニン	0.8%	332	271	193	
チロシン	0.6%	255			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	587	434	317	313
スレオニン	0.8%	336	253	184	206
トリプトファン	0.2%	95	83	60	69
バリン	0.9%	398	289	210	167
ヒスチジン	0.5%	236	112	81	77
アルギニン	1.1%	458	199	150	219

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	340	273	250	180	109	151
ロイシン	563	452	440	410	103	110
リジン	605	486	340	360	143	135
メチオニン・シスチン計	298	239	220	160	109	149
フェニルアラニン・チロシン計	587	471	380	390	124	121
スレオニン	336	269	250	210	108	128
トリプトファン	95	76	60	70	127	109
バリン	398	320	310	220	103	145
ヒスチジン	236	189	-	120	-	158
全窒素量(g)	1.2					

