

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	356	217	160	156
ロイシン	1.4%	594	397	286	248
リジン	1.5%	615	199	147	265
メチオニン	0.5%	206	199	139	
シスチン	0.3%	118			
メチオニン・シスチン計	0.8%	324	379	273	181
フェニルアラニン	0.8%	350	271	189	
チロシン	0.6%	273			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	623	434	311	307
スレオニン	0.8%	348	253	181	202
トリプトファン	0.2%	103	83	59	67
バリン	1.0%	419	289	206	164
ヒスチジン	0.6%	248	112	80	76
アルギニン	1.2%	523	199	147	214

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	356	270	250	180	108	150
ロイシン	594	450	440	410	102	110
リジン	615	466	340	360	137	130
メチオニン・シスチン計	324	246	220	160	112	154
フェニルアラニン・チロシン計	623	473	380	390	124	121
スレオニン	348	264	250	210	105	126
トリプトファン	103	78	60	70	130	112
バリン	419	318	310	220	103	145
ヒスチジン	248	188	-	120	-	157
全窒素量(g)	1.3					

