

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	354	217	174
ロイシン	1.3%	578	397	311
リジン	1.3%	606	199	160
メチオニン	0.5%	208	199	151
シスチン	0.2%	112		
メチオニン・シスチン計	0.7%	321	379	298
フェニルアラニン	0.7%	343	271	206
チロシン	0.6%	264		
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	607	434	339
スレオニン	0.7%	342	253	197
トリプトファン	0.2%	103	83	64
バリン	0.9%	415	289	224
ヒスチジン	1.0%	443	112	87
アルギニン	1.0%	465	199	160

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	354	269	250	180
ロイシン	578	440	440	410	100	107
リジン	606	462	340	360	136	128
メチオニン・シスチン計	321	245	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	607	462	380	390	122	118
スレオニン	342	260	250	210	104	124
トリプトファン	103	78	60	70	130	112
バリン	415	316	310	220	102	144
ヒスチジン	443	338	-	120	-	281
全窒素量(g)	1.3					

