

アミノ酸(参考)					
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	395	217	154	150
ロイシン	1.7%	674	397	276	240
リジン	1.7%	680	199	142	256
メチオニン	0.5%	220	199	134	
シスチン	0.3%	127			
メチオニン・シスチン計	0.9%	349	379	264	175
フェニルアラニン	1.0%	398	271	183	
チロシン	0.8%	311			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	709	434	301	297
スレオニン	0.9%	385	253	175	195
トリプトファン	0.3%	115	83	57	65
バリン	1.1%	458	289	199	159
ヒスチジン	0.8%	311	112	77	73
アルギニン	1.4%	562	199	142	207

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	395	267	250	180
ロイシン	674	456	440	410	104	111
リジン	680	460	340	360	135	128
メチオニン・シスチン計	349	236	220	160	107	148
フェニルアラニン・チロシン計	709	480	380	390	126	123
スレオニン	385	261	250	210	104	124
トリプトファン	115	78	60	70	129	111
バリン	458	310	310	220	100	141
ヒスチジン	311	211	-	120	-	175
全窒素量(g)	1.5					

