

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	370	217	161	157
ロイシン	1.5%	633	397	288	250
リジン	1.5%	649	199	148	267
メチオニン	0.5%	217	199	140	
シスチン	0.3%	122			
メチオニン・シスチン計	0.8%	341	379	275	182
フェニルアラニン	0.9%	374	271	191	
チロシン	0.7%	292			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	666	434	314	309
スレオニン	0.9%	370	253	182	203
トリプトファン	0.3%	109	83	59	68
バリン	1.0%	436	289	208	165
ヒスチジン	0.7%	299	112	81	76
アルギニン	1.3%	533	199	148	216

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	370	261	250	180	104	145
ロイシン	633	446	440	410	101	109
リジン	649	457	340	360	134	127
メチオニン・シスチン計	341	240	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	666	469	380	390	123	120
スレオニン	370	260	250	210	104	124
トリプトファン	109	77	60	70	128	110
バリン	436	307	310	220	99	140
ヒスチジン	299	211	-	120	-	176
全窒素量(g)	1.4					

