

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	362	217	177	172
ロイシン	1.3%	605	397	316	274
リジン	1.3%	627	199	163	293
メチオニン	0.5%	210	199	153	
シスチン	0.3%	121			
メチオニン・シスチン計	0.7%	331	379	302	200
フェニルアラニン	0.8%	360	271	209	
チロシン	0.6%	276			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	636	434	344	340
スレオニン	0.8%	360	253	200	223
トリプトファン	0.2%	105	83	65	74
バリン	0.9%	430	289	228	181
ヒスチジン	0.5%	253	112	88	84
アルギニン	1.1%	533	199	163	237

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	362	271	250	180	108	150
ロイシン	605	453	440	410	103	111
リジン	627	470	340	360	138	130
メチオニン・シスチン計	331	248	220	160	113	155
フェニルアラニン・チロシン計	636	476	380	390	125	122
スレオニン	360	269	250	210	108	128
トリプトファン	105	79	60	70	132	113
バリン	430	322	310	220	104	146
ヒスチジン	253	189	-	120	-	158
全窒素量(g)	1.3					

