

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）				
このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量		
		NRC		AAFCO
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	329	217	143
ロイシン	1.4%	545	397	223
リジン	1.6%	588	199	132
メチオニン	0.5%	177	199	125
シスチン	0.3%	97		
メチオニン・シスチン計	0.7%	274	379	245
フェニルアラニン	0.8%	314	271	170
チロシン	0.6%	243		
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	557	434	279
スレオニン	0.9%	321	253	162
トリプトファン	0.2%	93	83	53
バリン	1.0%	380	289	185
ヒスチジン	1.0%	363	112	72
アルギニン	1.1%	414	199	132

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量 (mg)		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	329	285	250	180	114	158
ロイシン	545	473	440	410	107	115
リジン	588	510	340	360	150	142
メチオニン・シスチン計	274	238	220	160	108	149
フェニルアラニン・チロシン計	557	483	380	390	127	124
スレオニン	321	279	250	210	112	133
トリプトファン	93	81	60	70	135	116
バリン	380	330	310	220	106	150
ヒスチジン	363	315	-	120	-	263
全窒素量(g)	1.2					

