

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	466	217	156	152
ロイシン	1.9%	778	397	279	242
リジン	1.8%	749	199	144	259
メチオニン	0.5%	220	199	136	
シスチン	0.4%	152			
メチオニン・シスチン計	0.9%	371	379	267	177
フェニルアラニン	1.2%	475	271	185	
チロシン	0.8%	346			
フェニルアラニン・チロシン計	2.0%	821	434	304	300
スレオニン	1.0%	431	253	177	197
トリプトファン	0.3%	133	83	58	66
バリン	1.3%	515	289	201	160
ヒスチジン	0.9%	385	112	78	74
アルギニン	1.7%	701	199	144	210

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	466	285	250	180	114	158
ロイシン	778	475	440	410	108	116
リジン	749	457	340	360	135	127
メチオニン・シスチン計	371	226	220	160	103	142
フェニルアラニン・チロシン計	821	501	380	390	132	129
スレオニン	431	263	250	210	105	125
トリプトファン	133	81	60	70	135	116
バリン	515	315	310	220	101	143
ヒスチジン	385	235	-	120	-	196
全窒素量(g)	1.6					

