

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	322	217	139	135
ロイシン	1.5%	537	397	249	216
リジン	1.6%	570	199	128	231
メチオニン	0.4%	162	199	121	
シスチン	0.3%	97			
メチオニン・シスチン計	0.7%	258	379	238	157
フェニルアラニン	0.8%	305	271	165	
チロシン	0.6%	236			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	541	434	271	267
スレオニン	0.9%	315	253	157	176
トリプトファン	0.2%	91	83	51	59
バリン	1.0%	365	289	179	143
ヒスチジン	0.8%	295	112	70	66
アルギニン	1.1%	420	199	128	187

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	322	283	250	180
ロイシン	537	471	440	410	107	115
リジン	570	499	340	360	147	139
メチオニン・シスチン計	258	226	220	160	103	141
フェニルアラニン・チロシン計	541	475	380	390	125	122
スレオニン	315	276	250	210	110	131
トリプトファン	91	80	60	70	133	114
バリン	365	320	310	220	103	146
ヒスチジン	295	259	-	120	-	216
全窒素量(g)	1.1					

