



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	371	217	165	161
ロイシン	1.4%	610	397	296	257
リジン	1.5%	640	199	152	274
メチオニン	0.5%	221	199	144	
シスチン	0.3%	118			
メチオニン・シスチン計	0.8%	340	379	283	187
フェニルアラニン	0.8%	359	271	196	
チロシン	0.6%	280			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	639	434	322	318
スレオニン	0.8%	359	253	187	209
トリプトファン	0.3%	109	83	61	70
バリン	1.0%	437	289	213	170
ヒスチジン	1.1%	469	112	83	78
アルギニン	1.2%	500	199	152	222

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	371	271	250	180
ロイシン	610	445	440	410	101	109
リジン	640	467	340	360	137	130
メチオニン・シスチン計	340	248	220	160	113	155
フェニルアラニン・チロシン計	639	466	380	390	123	120
スレオニン	359	262	250	210	105	125
トリプトファン	109	79	60	70	132	113
バリン	437	319	310	220	103	145
ヒスチジン	469	342	-	120	-	285
全窒素量(g)	1.4					

