

ver.4 このレシピのエネルギー		164	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	1.15	日分となります						
参考の表へ		142	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする						
		1/12(mon)		このレシピで摂取できる栄養			このレシピでの推奨量 *1		このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2				
		グラム					NRC		AAFCO			NRC		AAFCO	
				総重量			g		231.1			体重0.75乗ベース		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
				水分			g		185.9						
				乾燥重量			g		45.2						
				エネルギー			kcal		163.5						
				エネルギー密度			kcal/g		3.6						
</															

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	396	217	172	167
ロイシン	1.4%	650	397	307	266
リジン	1.5%	687	199	158	285
メチオニン	0.5%	237	199	149	
シスチン	0.3%	123			
メチオニン・シスチン計	0.8%	363	379	294	194
フェニルアラニン	0.8%	381	271	203	
チロシン	0.7%	297			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	678	434	334	330
スレオニン	0.8%	382	253	194	217
トリプトファン	0.3%	115	83	63	72
バリン	1.0%	464	289	221	176
ヒスチジン	1.1%	510	112	86	81
アルギニン	1.2%	530	199	158	230

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	396	273	250	180	109	152
ロイシン	650	447	440	410	102	109
リジン	687	473	340	360	139	131
メチオニン・シスチン計	363	250	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	678	467	380	390	123	120
スレオニン	382	263	250	210	105	125
トリプトファン	115	79	60	70	132	113
バリン	464	319	310	220	103	145
ヒスチジン	510	351	-	120	-	293
全窒素量(g)	1.5					

