

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	369	217	168	164
ロイシン	1.4%	607	397	301	261
リジン	1.4%	637	199	155	279
メチオニン	0.5%	220	199	146	
シスチン	0.3%	117			
メチオニン・シスチン計	0.8%	339	379	288	190
フェニルアラニン	0.8%	358	271	199	
チロシン	0.6%	277			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	636	434	328	323
スレオニン	0.8%	358	253	190	213
トリプトファン	0.2%	108	83	62	71
バリン	1.0%	435	289	217	173
ヒスチジン	1.1%	468	112	84	80
アルギニン	1.1%	499	199	155	226

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	369	271	250	180
ロイシン	607	445	440	410	101	109
リジン	637	467	340	360	137	130
メチオニン・シスチン計	339	249	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	636	466	380	390	123	120
スレオニン	358	263	250	210	105	125
トリプトファン	108	79	60	70	132	113
バリン	435	319	310	220	103	145
ヒスチジン	468	343	-	120	-	286
全窒素量(g)	1.4					

