

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	352	217	159	155
ロイシン	1.4%	589	397	285	247
リジン	1.5%	624	199	147	264
メチオニン	0.5%	203	199	138	
シスチン	0.3%	113			
メチオニン・シスチン計	0.8%	317	379	272	180
フェニルアラニン	0.8%	346	271	188	
チロシン	0.6%	269			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	615	434	310	306
スレオニン	0.8%	348	253	180	201
トリプトファン	0.2%	100	83	59	67
バリン	1.0%	414	289	205	163
ヒスチジン	0.6%	247	112	80	75
アルギニン	1.2%	504	199	147	214

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	352	275	250	180	110	153
ロイシン	589	460	440	410	105	112
リジン	624	487	340	360	143	135
メチオニン・シスチン計	317	247	220	160	112	155
フェニルアラニン・チロシン計	615	480	380	390	126	123
スレオニン	348	272	250	210	109	129
トリプトファン	100	78	60	70	131	112
バリン	414	323	310	220	104	147
ヒスチジン	247	193	-	120	-	160
全窒素量(g)	1.3					

