

ver.4 このレシピのエネルギー		139	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.98	日分となります					
参考の表へ		142	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする					
		1/16(fri)		このレシピで摂取できる栄養			このレシピでの推奨量 *1		このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量		このレシピでの上限量 *2		
		グラム					NRC		AAFCO			NRC		AAFCO
				総重量			g		233.0					
				水分			g		191.6					
				乾燥重量			g		41.4					
				エネルギー			kcal		138.8					
				エネルギー密度			kcal/g		3.4					

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	349	217	157	153
ロイシン	1.4%	572	397	282	244
リジン	1.2%	490	199	145	261
メチオニン	0.4%	176	199	137	
シスチン	0.4%	156			
メチオニン・シスチン計	0.8%	332	379	269	178
フェニルアラニン	0.9%	363	271	186	
チロシン	0.6%	266			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	629	434	306	302
スレオニン	0.8%	316	253	178	199
トリプトファン	0.3%	106	83	58	66
バリン	1.0%	432	289	203	161
ヒスチジン	0.5%	192	112	79	75
アルギニン	1.1%	437	199	145	211

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	349	292	250	180	117	162
ロイシン	572	479	440	410	109	117
リジン	490	411	340	360	121	114
メチオニン・シスチン計	332	278	220	160	126	174
フェニルアラニン・チロシン計	629	527	380	390	139	135
スレオニン	316	265	250	210	106	126
トリプトファン	106	89	60	70	148	127
バリン	432	362	310	220	117	165
ヒスチジン	192	161	-	120	-	134
全窒素量(g)	1.2					

