

| アミノ酸(参考) | | | | | |
|----------------|--------------|-----|------------|---------|---------|
| | このレシピで摂取できる量 | | このレシピでの推奨量 | | |
| | /DM | mg | NRC | | AAFCO |
| | | | 体重0.75乗ベース | 乾燥重量ベース | 乾燥重量ベース |
| イソロイシン | 1.0% | 428 | 217 | 161 | 157 |
| ロイシン | 1.7% | 725 | 397 | 288 | 250 |
| リジン | 1.8% | 749 | 199 | 148 | 267 |
| メチオニン | 0.5% | 225 | 199 | 140 | |
| シスチン | 0.3% | 134 | | | |
| メチオニン・シスチン計 | 0.9% | 360 | 379 | 275 | 182 |
| フェニルアラニン | 1.1% | 446 | 271 | 190 | |
| チロシン | 0.7% | 306 | | | |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 1.8% | 752 | 434 | 313 | 309 |
| スレオニン | 1.0% | 405 | 253 | 182 | 203 |
| トリプトファン | 0.3% | 114 | 83 | 59 | 68 |
| バリン | 1.2% | 499 | 289 | 207 | 165 |
| ヒスチジン | 0.7% | 298 | 112 | 80 | 76 |
| アルギニン | 1.5% | 615 | 199 | 148 | 216 |

| アミノ酸スコア(参考) | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| このレシピで摂取できる量 (mg) | 窒素1gあたりの アミノ酸量 | 算定用評点パターン | | アミノ酸スコアを計算する(%) | | |
| | | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | |
| | | イソロイシン | 428 | 287 | 250 | 180 |
| ロイシン | 725 | 486 | 440 | 410 | 110 | 119 |
| リジン | 749 | 502 | 340 | 360 | 148 | 139 |
| メチオニン・シスチン計 | 360 | 241 | 220 | 160 | 110 | 151 |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 752 | 504 | 380 | 390 | 133 | 129 |
| スレオニン | 405 | 272 | 250 | 210 | 109 | 129 |
| トリプトファン | 114 | 76 | 60 | 70 | 127 | 109 |
| バリン | 499 | 334 | 310 | 220 | 108 | 152 |
| ヒスチジン | 298 | 200 | - | 120 | - | 166 |
| 全窒素量(g) | 1.5 | | | | | |

