

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	442	217	152	148
ロイシン	1.9%	762	397	271	235
リジン	2.0%	779	199	140	251
メチオニン	0.6%	233	199	132	
シスチン	0.3%	140			
メチオニン・シスチン計	0.9%	374	379	259	172
フェニルアラニン	1.1%	455	271	179	
チロシン	0.8%	329			
フェニルアラニン・チロシン計	2.0%	784	434	295	291
スレオニン	1.0%	411	253	172	191
トリプトファン	0.3%	118	83	56	64
バリン	1.3%	509	289	195	156
ヒスチジン	0.7%	286	112	76	72
アルギニン	1.6%	642	199	140	203

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	442	278	250	180	111	155
ロイシン	762	479	440	410	109	117
リジン	779	490	340	360	144	136
メチオニン・シスチン計	374	236	220	160	107	147
フェニルアラニン・チロシン計	784	493	380	390	130	126
スレオニン	411	259	250	210	103	123
トリプトファン	118	74	60	70	124	106
バリン	509	320	310	220	103	146
ヒスチジン	286	180	-	120	-	150
全窒素量(g)	1.6					

