

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	354	217	148	145
ロイシン	1.5%	584	397	266	230
リジン	1.5%	605	199	137	246
メチオニン	0.5%	210	199	129	
シスチン	0.3%	109			
メチオニン・シスチン計	0.8%	321	379	254	168
フェニルアラニン	0.9%	346	271	176	
チロシン	0.7%	262			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	608	434	289	285
スレオニン	0.9%	346	253	168	188
トリプトファン	0.3%	101	83	55	63
バリン	1.1%	417	289	191	152
ヒスチジン	1.1%	443	112	74	70
アルギニン	1.2%	485	199	137	199

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	354	282	250	180
ロイシン	584	465	440	410	106	113
リジン	605	482	340	360	142	134
メチオニン・シスチン計	321	256	220	160	116	160
フェニルアラニン・チロシン計	608	484	380	390	127	124
スレオニン	346	276	250	210	110	131
トリプトファン	101	81	60	70	135	115
バリン	417	332	310	220	107	151
ヒスチジン	443	353	-	120	-	295
全窒素量(g)	1.3					

