



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	371	217	144	140
ロイシン	1.6%	622	397	258	223
リジン	1.7%	651	199	133	239
メチオニン	0.5%	204	199	125	
シスチン	0.3%	114			
メチオニン・シスチン計	0.8%	318	379	246	163
フェニルアラニン	1.0%	369	271	170	
チロシン	0.7%	280			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	649	434	280	277
スレオニン	1.0%	363	253	163	182
トリプトファン	0.3%	102	83	53	61
バリン	1.1%	432	289	186	148
ヒスチジン	0.7%	255	112	72	68
アルギニン	1.4%	519	199	133	193

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	371	287	250	180
ロイシン	622	481	440	410	109	117
リジン	651	504	340	360	148	140
メチオニン・シスチン計	318	246	220	160	112	154
フェニルアラニン・チロシン計	649	503	380	390	132	129
スレオニン	363	281	250	210	112	134
トリプトファン	102	79	60	70	132	113
バリン	432	335	310	220	108	152
ヒスチジン	255	198	-	120	-	165
全窒素量(g)	1.3					

