

| アミノ酸(参考) | | | | | |
|----------------|--------------|-----|------------|---------|---------|
| | このレシビで摂取できる量 | | このレシビでの推奨量 | | |
| | /DM | mg | NRC | | AAFCO |
| | | | 体重0.75乗ベース | 乾燥重量ベース | 乾燥重量ベース |
| イソロイシン | 0.9% | 308 | 217 | 128 | 125 |
| ロイシン | 1.5% | 511 | 397 | 230 | 199 |
| リジン | 1.3% | 437 | 199 | 118 | 213 |
| メチオニン | 0.5% | 164 | 199 | 111 | |
| シスチン | 0.4% | 140 | | | |
| メチオニン・シスチン計 | 0.9% | 304 | 379 | 220 | 145 |
| フェニルアラニン | 1.0% | 324 | 271 | 152 | |
| チロシン | 0.7% | 237 | | | |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 1.7% | 561 | 434 | 250 | 247 |
| スレオニン | 0.8% | 285 | 253 | 145 | 162 |
| トリプトファン | 0.3% | 92 | 83 | 47 | 54 |
| バリン | 1.1% | 388 | 289 | 166 | 132 |
| ヒスチジン | 0.5% | 169 | 112 | 64 | 61 |
| アルギニン | 1.1% | 378 | 199 | 118 | 172 |

| アミノ酸スコア(参考) | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| このレシビで摂取できる量 (mg) | 窒素1gあたりの アミノ酸量 | 算定用評点パターン | | アミノ酸スコアを計算する(%) | | |
| | | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | |
| | | イソロイシン | 308 | 309 | 250 | 180 |
| ロイシン | 511 | 513 | 440 | 410 | 116 | 125 |
| リジン | 437 | 438 | 340 | 360 | 129 | 122 |
| メチオニン・シスチン計 | 304 | 305 | 220 | 160 | 139 | 190 |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 561 | 564 | 380 | 390 | 148 | 144 |
| スレオニン | 285 | 286 | 250 | 210 | 114 | 136 |
| トリプトファン | 92 | 93 | 60 | 70 | 155 | 132 |
| バリン | 388 | 390 | 310 | 220 | 126 | 177 |
| ヒスチジン | 169 | 169 | - | 120 | - | 141 |
| 全窒素量(g) | 1.0 | | | | | |

