

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	162	217	64	62
ロイシン	1.6%	273	397	114	99
リジン	1.7%	293	199	59	106
メチオニン	0.6%	94	199	55	
シスチン	0.3%	49			
メチオニン・シスチン計	0.9%	143	379	109	72
フェニルアラニン	0.9%	159	271	75	
チロシン	0.7%	123			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	282	434	124	122
スレオニン	1.0%	162	253	72	80
トリプトファン	0.3%	45	83	23	27
バリン	1.1%	191	289	82	65
ヒスチジン	0.7%	113	112	32	30
アルギニン	1.3%	225	199	59	86

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	162	289	250	180	116	161
ロイシン	273	488	440	410	111	119
リジン	293	524	340	360	154	146
メチオニン・シスチン計	143	255	220	160	116	160
フェニルアラニン・チロシン計	282	504	380	390	133	129
スレオニン	162	290	250	210	116	138
トリプトファン	45	80	60	70	133	114
バリン	191	341	310	220	110	155
ヒスチジン	113	203	-	120	-	169
全窒素量(g)	0.6					

