

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.7%	298	217	160	156
ロイシン	1.2%	502	397	286	248
リジン	1.1%	465	199	147	265
メチオニン	0.4%	158	199	139	
シスチン	0.3%	116			
メチオニン・シスチン計	0.7%	274	379	273	181
フェニルアラニン	0.7%	308	271	189	
チロシン	0.5%	226			
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	533	434	311	307
スレオニン	0.7%	286	253	181	202
トリプトファン	0.2%	87	83	59	67
バリン	0.9%	368	289	206	164
ヒスチジン	0.4%	176	112	80	76
アルギニン	1.0%	403	199	147	215

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	298	370	250	180	148	206
ロイシン	502	624	440	410	142	152
リジン	465	578	340	360	170	161
メチオニン・シスチン計	274	340	220	160	155	213
フェニルアラニン・チロシン計	533	663	380	390	175	170
スレオニン	286	356	250	210	142	169
トリプトファン	87	109	60	70	181	155
バリン	368	457	310	220	148	208
ヒスチジン	176	219	-	120	-	183
全窒素量(g)	0.8					

