

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ＋スペース＋2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	340	217	169	165
ロイシン	1.3%	568	397	302	262
リジン	1.3%	579	199	156	280
メチオニン	0.4%	187	199	147	
シスチン	0.3%	111			
メチオニン・シスチン計	0.7%	298	379	289	191
フェニルアラニン	0.8%	341	271	200	
チロシン	0.6%	256			
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	597	434	329	325
スレオニン	0.8%	335	253	191	213
トリプトファン	0.2%	98	83	62	71
バリン	0.9%	403	289	218	173
ヒスチジン	0.5%	233	112	84	80
アルギニン	1.1%	493	199	156	227

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量 (mg)		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	340	278	250	180	111	154
ロイシン	568	464	440	410	106	113
リジン	579	473	340	360	139	131
メチオニン・シスチン計	298	244	220	160	111	152
フェニルアラニン・チロシン計	597	488	380	390	128	125
スレオニン	335	274	250	210	110	130
トリプトファン	98	80	60	70	133	114
バリン	403	329	310	220	106	150
ヒスチジン	233	190	-	120	-	159
全窒素量(g)	1.2					

