

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	366	217	165	161
ロイシン	1.4%	611	397	296	257
リジン	1.5%	631	199	152	274
メチオニン	0.5%	198	199	144	
シスチン	0.3%	115			
メチオニン・シスチン計	0.7%	313	379	283	187
フェニルアラニン	0.8%	364	271	196	
チロシン	0.6%	277			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	641	434	322	317
スレオニン	0.8%	356	253	187	209
トリプトファン	0.2%	104	83	61	70
バリン	1.0%	430	289	213	170
ヒスチジン	0.6%	250	112	83	78
アルギニン	1.2%	511	199	152	222

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	366	283	250	180	113	157
ロイシン	611	472	440	410	107	115
リジン	631	488	340	360	144	136
メチオニン・シスチン計	313	242	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	641	496	380	390	130	127
スレオニン	356	275	250	210	110	131
トリプトファン	104	80	60	70	133	114
バリン	430	332	310	220	107	151
ヒスチジン	250	193	-	120	-	161
全窒素量(g)	1.3					

