

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ＋スペース＋2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	315	217	156	152
ロイシン	1.3%	550	397	279	242
リジン	1.3%	549	199	144	259
メチオニン	0.4%	172	199	136	
シスチン	0.3%	104			
メチオニン・シスチン計	0.7%	274	379	267	177
フェニルアラニン	0.8%	322	271	185	
チロシン	0.6%	248			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	569	434	304	300
スレオニン	0.8%	312	253	177	197
トリプトファン	0.2%	92	83	58	66
バリン	0.9%	371	289	201	160
ヒスチジン	0.5%	186	112	78	74
アルギニン	1.1%	449	199	144	210

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	315	280	250	180	112	156
ロイシン	550	490	440	410	111	119
リジン	549	489	340	360	144	136
メチオニン・シスチン計	274	244	220	160	111	152
フェニルアラニン・チロシン計	569	507	380	390	133	130
スレオニン	312	278	250	210	111	132
トリプトファン	92	82	60	70	137	117
バリン	371	330	310	220	107	150
ヒスチジン	186	166	-	120	-	138
全窒素量(g)	1.1					

