

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	298	217	147	143
ロイシン	1.3%	498	397	262	228
リジン	1.4%	527	199	135	243
メチオニン	0.4%	150	199	127	
シスチン	0.2%	87			
メチオニン・シスチン計	0.6%	236	379	251	166
フェニルアラニン	0.7%	282	271	174	
チロシン	0.6%	215			
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	496	434	285	282
スレオニン	0.8%	294	253	166	185
トリプトファン	0.2%	82	83	54	62
バリン	0.9%	338	289	189	150
ヒスチジン	0.7%	272	112	73	69
アルギニン	1.0%	389	199	135	197

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	298	296	250	180	118	164
ロイシン	498	494	440	410	112	121
リジン	527	523	340	360	154	145
メチオニン・シスチン計	236	234	220	160	106	146
フェニルアラニン・チロシン計	496	492	380	390	130	126
スレオニン	294	291	250	210	117	139
トリプトファン	82	82	60	70	136	117
バリン	338	335	310	220	108	152
ヒスチジン	272	270	-	120	-	225
全窒素量(g)	1.0					

