

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.7%	337	217	174	169
ロイシン	1.2%	554	397	311	270
リジン	1.3%	582	199	160	289
メチオニン	0.4%	188	199	151	
シスチン	0.2%	104			
メチオニン・シスチン計	0.6%	292	379	298	197
フェニルアラニン	0.7%	330	271	206	
チロシン	0.5%	251			
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	582	434	339	334
スレオニン	0.7%	326	253	197	220
トリプトファン	0.2%	97	83	64	73
バリン	0.9%	396	289	224	179
ヒスチジン	0.9%	405	112	87	82
アルギニン	0.9%	429	199	160	234

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	337	280	250	180	112	156
ロイシン	554	460	440	410	105	112
リジン	582	484	340	360	142	134
メチオニン・シスチン計	292	243	220	160	110	152
フェニルアラニン・チロシン計	582	483	380	390	127	124
スレオニン	326	271	250	210	108	129
トリプトファン	97	80	60	70	134	115
バリン	396	329	310	220	106	150
ヒスチジン	405	337	-	120	-	281
全窒素量(g)	1.2					

