

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	348	217	163	159
ロイシン	1.4%	598	397	293	254
リジン	1.4%	619	199	151	271
メチオニン	0.5%	198	199	142	
シスチン	0.3%	108			
メチオニン・シスチン計	0.7%	308	379	280	185
フェニルアラニン	0.8%	352	271	194	
チロシン	0.6%	273			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	625	434	318	314
スレオニン	0.8%	349	253	185	206
トリプトファン	0.2%	100	83	60	69
バリン	1.0%	409	289	211	168
ヒスチジン	0.6%	278	112	82	77
アルギニン	1.1%	479	199	151	219

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	348	277	250	180	111	154
ロイシン	598	477	440	410	108	116
リジン	619	494	340	360	145	137
メチオニン・シスチン計	308	246	220	160	112	153
フェニルアラニン・チロシン計	625	498	380	390	131	128
スレオニン	349	279	250	210	112	133
トリプトファン	100	80	60	70	133	114
バリン	409	327	310	220	105	148
ヒスチジン	278	222	-	120	-	185
全窒素量(g)	1.3					

