

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ＋スペース＋2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	399	217	176	171
ロイシン	1.5%	673	397	314	273
リジン	1.5%	712	199	162	291
メチオニン	0.5%	232	199	152	
シスチン	0.3%	120			
メチオニン・シスチン計	0.8%	355	379	300	199
フェニルアラニン	0.8%	392	271	208	
チロシン	0.7%	306			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	698	434	342	337
スレオニン	0.9%	394	253	199	222
トリプトファン	0.2%	113	83	65	74
バリン	1.0%	465	289	226	180
ヒスチジン	0.9%	398	112	88	83
アルギニン	1.2%	532	199	162	236

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	399	279	250	180	112	155
ロイシン	673	471	440	410	107	115
リジン	712	498	340	360	147	138
メチオニン・シスチン計	355	248	220	160	113	155
フェニルアラニン・チロシン計	698	489	380	390	129	125
スレオニン	394	276	250	210	110	132
トリプトファン	113	79	60	70	131	113
バリン	465	326	310	220	105	148
ヒスチジン	398	279	-	120	-	232
全窒素量(g)	1.4					

