

[illegible]

分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

ラム数ではなくて、個数または杯数です。
方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.7%	319	217	165	160
ロイシン	1.2%	527	397	295	256
リジン	1.3%	558	199	152	273
メチオニン	0.4%	189	199	143	
シスチン	0.2%	97			
メチオニン・シスチン計	0.7%	288	379	282	186
フェニルアラニン	0.7%	309	271	195	
チロシン	0.6%	242			
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	551	434	321	316
スレオニン	0.7%	312	253	186	208
トリプトファン	0.2%	92	83	61	69
バリン	0.9%	375	289	212	169
ヒスチジン	0.9%	409	112	82	78
アルギニン	1.0%	414	199	152	221

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	319	284	250	180	114	158
ロイシン	527	469	440	410	107	114
リジン	558	497	340	360	146	138
メチオニン・シスチン計	288	257	220	160	117	160
フェニルアラニン・チロシン計	551	491	380	390	129	126
スレオニン	312	278	250	210	111	132
トリプトファン	92	82	60	70	136	117
バリン	375	334	310	220	108	152
ヒスチジン	409	364	-	120	-	303
全窒素量(g)	1.1					

