

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	347	217	158	154
ロイシン	1.4%	598	397	283	245
リジン	1.5%	617	199	146	262
メチオニン	0.5%	200	199	137	
シスチン	0.3%	110			
メチオニン・シスチン計	0.7%	311	379	270	179
フェニルアラニン	0.8%	352	271	187	
チロシン	0.7%	272			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	624	434	308	304
スレオニン	0.8%	351	253	179	200
トリプトファン	0.2%	100	83	58	67
バリン	1.0%	411	289	204	162
ヒスチジン	0.7%	278	112	79	75
アルギニン	1.2%	486	199	146	212

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	347	275	250	180
ロイシン	598	474	440	410	108	116
リジン	617	489	340	360	144	136
メチオニン・シスチン計	311	246	220	160	112	154
フェニルアラニン・チロシン計	624	494	380	390	130	127
スレオニン	351	278	250	210	111	132
トリプトファン	100	79	60	70	132	113
バリン	411	325	310	220	105	148
ヒスチジン	278	220	-	120	-	184
全窒素量(g)	1.3					

