

アミノ酸(参考)				
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.7%	294	217	154
ロイシン	1.3%	510	397	275
リジン	1.3%	522	199	142
メチオニン	0.4%	155	199	134
シスチン	0.2%	95		
メチオニン・シスチン計	0.6%	250	379	263
フェニルアラニン	0.7%	299	271	182
チロシン	0.6%	229		
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	528	434	300
スレオニン	0.7%	291	253	174
トリプトファン	0.2%	83	83	57
バリン	0.9%	353	289	198
ヒスチジン	0.5%	188	112	77
アルギニン	1.0%	414	199	142

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	294	495	250	180
ロイシン	510	858	440	410	195	209
リジン	522	878	340	360	258	244
メチオニン・シスチン計	250	420	220	160	191	262
フェニルアラニン・チロシン計	528	888	380	390	234	228
スレオニン	291	490	250	210	196	233
トリプトファン	83	140	60	70	234	200
バリン	353	593	310	220	191	270
ヒスチジン	188	317	-	120	-	264
全窒素量(g)	0.6					

