

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.7%	315	202	166	162
ロイシン	1.2%	538	370	298	258
リジン	1.3%	559	185	153	276
メチオニン	0.4%	175	185	144	
シスチン	0.2%	101			
メチオニン・シスチン計	0.6%	275	353	285	188
フェニルアラニン	0.7%	310	252	197	
チロシン	0.5%	238			
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	548	404	324	320
スレオニン	0.7%	313	235	188	210
トリプトファン	0.2%	89	77	61	70
バリン	0.9%	379	269	215	171
ヒスチジン	0.4%	192	104	83	79
アルギニン	1.0%	434	185	153	223

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量 (mg)		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	315	280	250	180	112	156
ロイシン	538	478	440	410	109	117
リジン	559	497	340	360	146	138
メチオニン・シスチン計	275	245	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	548	487	380	390	128	125
スレオニン	313	278	250	210	111	132
トリプトファン	89	79	60	70	132	113
バリン	379	337	310	220	109	153
ヒスチジン	192	171	-	120	-	142
全窒素量(g)	1.1					

